

zoetis



7 26287 12881 6
FPO - UPC

Kalamazoo, MI 49007, USA

Zoetis Inc.

190

Licencia Vet. de EUU. No. 190

Ver las instrucciones completas al revés.

Contiene mercurio, neomicina, polymixina B y amphotericina B como agentes conservantes.

Almacenar en la oscuridad entre 2°C y 7°C (35°F a 45°F). EVITAR LA CONGELACIÓN. No vacunar dentro de los 60 días anteriores al sacrificio.

Infecciones causadas por los virus EHV 1b así como para el uso en yeguas gestantes como ayuda en la prevención de abortos debidos a respiratorias causadas por virus EHV 1b y 45°F.

Para la vacunación por vía intramuscular de caballos sanos de 9 meses de edad o mayores como ayuda en la prevención de abortos debidos a respi-

Pneumabort-K®+1b

Virus Inactivado

Vacuna contra la Rhinopneumonitis Equina

1 Dosis

2 mL

2 mL

1 Dose

Equine Rhinopneumonitis Vaccine

Killed Virus

Pneumabort-K®+1b

For intramuscular vaccination of healthy horses 9 months of age or older as an aid in the prevention of respiratory diseases caused by the EHV 1p and EHV 1b viruses as well as for use in pregnant mares as an aid in the prevention of abortion due to EHV 1 infections.

Store in the dark at 2° to 7°C (35° to 45°F). AVOID FREEZING. Do not vaccinate within 60 days before slaughter.

Thimerosal, neomycin, polymyxin B and amphotericin B added as preservatives.

See reverse side for complete directions.

U.S. Vet. License No. 190

Zoetis Inc.

Kalamazoo, MI 49007, USA

Serial No.:
Nº de Lote:
Expiration Date:
Fecha de Venc.:

zoetis

13943800

Pneumabort-K®+1b

PEEL HERE
DESEGUIR Aquí

Pneumabort-K®+1b

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Para yeguas gestantes, administrar asepticamente una dosis de 2 mL por vía intramuscular durante el quinto, séptimo y noveno mes de la gestación. Revacunar anualmente durante el quinto, séptimo y noveno mes de la gestación.

Para caballos jóvenes, administrar asepticamente una dosis de 2 mL por vía intramuscular después del destete, seguida de una segunda dosis de 2 mL de 3 a 4 semanas después. Revacunar con una sola dosis de 2 mL 6 meses después de la segunda dosis primaria y después, anualmente. Para asegurar la colocación y retención apropiadas de la vacuna, inyectar profundamente en los músculos pesados del cuarto trasero. Para promover la absorción se recomienda ejercicio leve durante una semana después de la inyección.

PRECAUCIÓN: Almacenar en la oscuridad entre 2° y 7°C (35° y 45°F). EVITAR LA CONGELACIÓN. AGITAR VIGOROSAMENTE para asegurar la suspensión uniforme de la vacuna. Al usarse de acuerdo con las instrucciones, rara vez se presentan reacciones adversas locales o sistémicas. De vez en cuando puede resultar una tumefacción o induración local en el sitio de inyección. No vacunar dentro de los 60 días anteriores al sacrificio. En caso de reacción anafilactoidea, administrar epinefrina.

Contiene timerosal, neomicina, polimixina B y anfotericina B como agentes conservantes.

Uso Veterinario

Desprender la etiqueta con el número de lote y la fecha de vencimiento y colocarla en el registro médico del animal.

Pneumabort-K®+1b

DOSAGE AND ADMINISTRATION: For pregnant mares, aseptically administer one 2 mL dose intramuscularly during the 5th, 7th and 9th months of pregnancy. Revaccinate annually at the 5th, 7th and 9th months of pregnancy.

For young horses, aseptically administer one 2 mL dose intramuscularly after weaning, followed by a second 2 mL dose 3 to 4 weeks later. Revaccinate with a single 2 mL dose 6 months after the second primary dose and annually thereafter. To insure proper placement and retention of the vaccine, inject deep into the heavy muscles of the hindquarter. Mild exercise to promote absorption is recommended for one week after injection.

CAUTION: Store in the dark at 2° to 7°C (35° to 45°F). AVOID FREEZING. SHAKE VIGOROUSLY to assure uniform suspension of the vaccine. When used according to instructions, local or systemic reactions rarely occur. An occasional local swelling or induration at the site of injection may be encountered. Do not vaccinate within 60 days before slaughter. In case of anaphylactoid reaction, administer epinephrine.

Thimerosal, neomycin, polymyxin B and amphotericin B added as preservatives.

For Veterinary Use Only

Remove serial number and expiration date label and place on the animal's medical chart.